




سستی زراطیعی

خشخاش:



بوته ای است یکساله که در مناطق معتدل می روید. رشد سالانه این گیاه به ارتفاعی معادل ۷۰-۱۱۰ سانتیمتر می رسد. در اواسط بهار، بعد از این که گل های رنگارنگ آن کم کم شروع به ریختن می کند، از میان گل ها کپسول ظاهر می شود که به آن گرز خشخاش می گویند. این گرزها در اواخر بهار و اوائل تابستان دارای پوست سبزی است که به زردی می گراید. البته، قبل از این که میوه گیاه خشک و زرد شود به روش خاص مبادرت به تیغ زدن آن می نمایند. این کار به وسیله افرادی که تجربه خاصی در تیغ زدن دارند، انجام می شود. آنان در ساعات اولیه شب با تیغهای مخصوص و با ایجاد چندین شیار افقی و یا عمودی و یا مورب بر روی گرزها مبادرت به تیغ زدن می نمایند. صبح روز بعد، شیره سفید رنگی از محل شکافهای گرز به بیرون ترشح می کند و در مجاورت هوا به صمغ قهوه ای رنگ تبدیل گردیده در پیاله مخصوص جمع آوری و برای تریاک مالی آماده و به صورت لول روانه بازار قاچاق می شود



سستی زای طبیعی

تاریخچه تریاک

قدیمی ترین و مشهورترین ماده مخدر است که از گیاه خشخاش به دست می آید. این گیاه حدود ۲۵۰۰ سال قبل در منطقه مدیترانه کشت می شده است. سابقه این گیاه را تا ۵۰۰۰ سال قبل هم ذکر می کنند. از آثاری که از سومریها باقی مانده است، چنین بر می آید، آنها این ماده را استعمال می کرده اند و با آن گیاه شادی بخش می گفتند. در نوشته های هومر از تریاک نام برده شده است

شکل ظاهری

تریاک شیره منعقد شده تخمدان کال بوته خشخاش است که از نظر علمی به پاپاور معروف است. تریاک آماده مصرف، ماده ای است خمیری به رنگ قهوه ای که بر حسب نوع و منطقه کشت خشخاش و آب و هوای منطقه پرورش از قهوه ای روشن تا تیره وجود دارد نامهای دیگر آن افیون، اپیوم و تریاق می باشد






سستی زاپیعی

الکالوئید های تریاک :

تریاک دارای ترکیبات بسیاری است که تاکنون ۲۵ نوع موثر آن شناخته شده است. مهمترین آلکالوئیدهای تریاک عبارتند از مرفین، نارکوتین، پاپاورین، تبائین، کدئین و نارسئین

نحوه مصرف:

تدخین به وسیله وافور و یا با وسیله ای مانند آن مثل قلیان، قلقلی، سیخ و سنگ استفاده به صورت قرص حل کردن در آب یا چای و نوشیدن آن





سستی زناطبیعی

عوارض

مغز: وابستگی (اعتیاد)، بی خوابی هنگام شب، خواب الودگی در طی روز
تغییرات شخصیتی:

۱- کاهش علائق و انگیزه ها

۲- کاهش احساس مسئولیت

۳- کاهش توجه به تحصیل، شغل و خانواده

۴- افسردگی و بی قراری، پر خاشگری، اغماء به دنبال مصرف زیاد

گوارش: تهوع و استفراغ، کاهش اسید معده و اختلال در هضم غذا، کاهش
فعالیت روده ها و یبوست مزمن، بی اشتها و کاهش وزن، سوء تغذیه، خشکی
دهان، اختلال در کبد

پوست: خارش، تیره شدن رنگ پوست، تیرگی لبها، کهیر

بیضه و تخمدان: کاهش توان و میل جنسی، بهم خوردن دوره های قاعدگی در
زنان

تضعیف دفاع بدن علیه بیماریها: بی حسی و عدم تعادل بدنی، عفونت ریه، یست
تنفسی به دنبال مصرف زیاد، انقباض مردمک چشم





الکالوئید های تریاک

مرفین :



مرفین از کلمه مورفئوس خدای رویایی یونان باستان مشتق شده است و یکی از اجزای اصلی و اساسی تریاک است که به طور متوسط از هر ۱۰ کیلوگرم تریاک یک کیلوگرم مرفین تهیه می‌شود. رنگ آن به صورت کرم روشن و گاهی اوقات به رنگ آرد نخودچی و مزه آن تلخ است ذرات آن در زیر ذره بین شبیه کریستال های سوزنی است. این ماده مهمترین آلکالوئید تریاک است و از لحاظ دارو شناسی ، تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی باعث کنترل دردهای شدید می شود و به همین خاطر مصرف مجاز آن فقط در بیمارستانهاست و بالاخص پس از عمل های جراحی باز استفاده می شود. این دارو در درمان یا تسکین درد انفارکتوس (سکته قلبی) و عوارض قلبی و عروقی آن تجویز می گردد. علاوه بر این در درمان آب آوردگی حاد ریوی نیز مصرف دارد. در گذشته ، تقریبا مرفین صرفا بصورت تزریقی مصرف داشت. هم اکنون مرفین در اشکال مختلف خرید و فروش می شود که از آن جمله محلول های خوراکی، قرص و کپسول و شیاف می باشد.



الکالوید های تریاک

عوارض :

شواهد موجود نشان می دهند که مصرف مرفین در فواصل ۱۲ - ۲۴ ساعت بیش از ۳ بار بصورت متوالی باعث اعتیاد می شود. ایجاد تمایلات شدید و گرایش شدید فرد به مصرف دارو باعث می شود تا زندگی فرد از حالت عادی خارج شده و محور تمام فعالیتهای روزانه فرد در پی تهیه و مصرف این ماده مرگبار قرار گیرد. خواب آلودگی، یبوست، کندی تنفس و ایجاد شعف، وابستگی جسمی، اعتیاد و مقاومت بدنی. از علایم بارز مصرف آن است





الکالوئید های تریاک

کدئین :

یکی از مشتقات معروف تریاک است که ۰/۲ الی ۰/۸ درصد آن را تشکیل می‌دهد و به عنوان مسکن در اشکال مختلف قرص، کپسول و شربت در پزشکی کاربرد دارد. اثر کدئین در حدود اثر مرفین است و در صورتی که زیاد مصرف شود علائمی مانند اثرات مرفین خواهد داشت. نحوه مصرف آن به صورت تزریقی و خوراکی می‌باشد

پاپاورین :

یکی از مشتقات مؤثر تریاک می‌باشد که سفید کریستالی است و از نظر زهر آگین بودن حد وسط مرفین و کدئین است. ماده ای است نشاط آور و محرک. کار عضلات صاف مثل روده را کند کرده و باعث شل شدن آنها می‌گردد. در برونشها و رگها انبساط ایجاد نموده و در آب نامحلول است و در الکل حل می‌شود





نقش خانواده‌ها در پیشگیری از اعتیاد جوانان

۸. از دیگر عوامل بازدارنده از اعتیاد، دین و معنویت است. باورهای معنوی اگر عمیق و ریشه‌دار باشند، جوان را در برابر انحرافات، «روئین تن» و مقاوم می‌کنند. یک اعتقاد دینی پخته و بالغ می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر سلامت روحی و اخلاقی جوان داشته باشد. در حالی که یک اعتقاد دینی نابالغ خرافه آمیز، نه تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند مولد نابسامانی‌هایی مانند وسواس و افسردگی و پرخاشگری و خشونت ورزی باشد. والدین می‌توانند و باید طعم معنویت واقعی را به فرزندان بچشانند. در آیین اسلام، مشروبات الکلی اکیدا ممنوع اعلام شده (چنانکه در فرهنگ ایرانی و آیین زرتشت نیز از آن با عنوان «این آشام پلید!» یاد می‌شود و مسیح نیز می‌فرماید: «مستان، ملکوت خدا را در نخواهند یافت.») درباره استعمال مواد مخدر، باید اذعان داشت از آنجا که این پدیده در زمان ظهور اسلام و ادیان پیش از آن رایج نبوده است، حکم صریحی در این خصوص صادر نشده، ولیکن قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (زیان رساندن به خود و دیگری در اسلام ممنوع است) بیانگر حرام بودن قطعی آن است.



Islamic Republic Of Iran
Anti - Narcotics Police



پلیس مبارزه با موادمخدر
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

پلیس مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان

با تشکر از نگاه گرمتون

گرد آورنده: ستوانیکم فرهاد محمودی

شادی روح شهدای گرانقدر پلیس مبارزه با موادمخدر صلوات